Therapeutischer Effekt von Laktobacillus

Babak Bahadori

Historischer Rückblick

- ▶ Abraham verdankte seine Langlebigkeit dem Konsum von angesäuerter Milch.
Genesis 18:8
- ▶ Abraham starb im Alter von 175 Jahren
- ▶ Sein 1. Sohn Ismael wurde geboren, als er 86 Jahre alt war.
- ▶ Bei der Geburt seines 2. Sohnes Isaak war Abraham 100 Jahre alt.

Escherich, Theodor

Ilya Mechnikov

Laktobazillus hat bakterizide und entzündungshemmende Eigenschaften

- ▶ Produktion von Milchsäure H₂O₂ etc.
- ▶ Verbesserung der Mucosabarriere des Darms (Mucinbildung)
- ▶ Hemmung der Adhärenz der Bakterien
- ▶ Regulation der antiinflammatorischen Cytokine

Laktobacillus in der Prävention und Therapie

Erkrankungen, bei denen die Wirksamkeit von Laktobacillus belegt ist

- ▶ Behandlung von akuter infektiöser Diarrhö bei Kindern
- ▶ Prävention von antibiotikaassoziierter Diarrhö
- ▶ Prävention der nekrotisierenden Enterokolitis

Grazer Modell

- ▶ Prävention der nekrotisierenden Entereocolitis (NEC) bei Neu- und Frühgeborenen
- ▶ Muttermilch, Gentamycin, Nystatin und LCR35
- ▶ 1993 bis 2012
- ▶ 11252 Neugeborene
- ▶ davon 5631 Frühgeborene
- ▶ ca. 182.500 Behandlungstage
- ▶ Die NEC Inzidenz bei FG mit einem Geburtsgewicht <1501g lag in Graz mit ca 1% pro Jahr immer sehr niedrig im Vergleich zu internationalen Daten (4-8%).

Schmolzer G, Urlesberger B et al.: Multi-modal approach to prophylaxis of necrotizing enterocolitis: clinical report and review of literature. Ped Surgery Int (2006) 22:573-580

Erkrankung	Wirkung von Probiotika		
	gesichert	möglich	fraglich
Adipositas			x
adjuvante Helicobacter-pylori-Therapie	Lactobacillus (Lb)	x	
akute infektiöse Diarrhö (Kinder)	Lb rhamnosus (Florea, Antibiohilus)		
antibiotikaassoziierte Diarrhö (Prävention)	Sacharomycis boulardi (Yomogi)	x	
atopische Dermatitis (Prävention)	??	x	
Colitis ulcerosa und Pouchitis (Rezidivprophylaxe)	E. coli nisse (1917) (Mutaflor)	x	
Kolonkrebs	??		x
Laktosemalabsorption	??		x
nekrotisierende Enterokolitis (Prävention)	Lb rhamnosus (Florea, Antibiohilus)	x	
postoperative infektiöse Komplikationen (Prävention)	??	x	
Reisediarrhö (Prävention)	Lb rhamnosus (Florea, Antibiohilus)	x	
Reizdarmsyndrom (Therapie)	Sacharomycis boulardi (Yomogi)	x	
Infektionen des Respirations- und Urogenitaltrakts (Prävention)	??	x	

Helicobacter pylori Eradikation

Ein neuer (?) therapeutischer Ansatz

Helicobacter pylori

- ▶ **1905 Walter Krienitz** (dt. Internist 1876-1943) beschrieb, dass der Magen mit Bakterien besiedelt sein kann.
- ▶ Trotzdem war state of the art; Ursache von gastroduodenalen Ulkuskrankheiten ist die „Übersäuerung des Magens“
- ▶ Gastroduodenale Ulkuskrankheiten wurden auch lange als typische psychosomatische Erkrankungen angesehen (Stress -> Übersäuerung des Magens -> Ulkus) und neben Antacida auch mit psychotherapeutischen Maßnahmen behandelt.
- ▶ **1983 Barry Marshall und John Robin Warren** aus Perth, Western Australia, entdeckten, dass H. pylori im Magen bis zu einem pH von 1-1.4 überleben können
- ▶ **1989 Selbstversuch Marshalls**
 - ▶ HP-Kultur geschluckt, nach einer Woche Gastritis, HP-Nachweis durch Biopsie und anschließende Eradikation mit Wismut und Antibiotika
- ▶ **2005 Nobelpreis für Physiologie**

Helicobacter pylori

- ▶ 1983 Barry Marshall und John Robin Warren als Campylobacter pyloridis beschrieben.
- ▶ Aerobes, gramnegatives , helixartig gedrehtes, Stabbakterium
- ▶ Kann im Magen bis zu einem pH-Wert von 1.0 existieren, muss sich aber gegen die Magensäure und -enzyme schützen.
- ▶ Daher nistet er sich unter der Magenschleimhautbarriere ein und hebt den pH-Wert der unmittelbaren Umgebung durch Spaltung von Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid an („Ammoniakmantel“)
- ▶ Diese Reaktion wird durch das von H. pylori produzierte Enzym Urease katalysiert, welches auch dem diagnostischen Nachweis dient (Helicobacter-Urease-Test).
- ▶ Durch Stoffwechselprodukte entsteht eine lokale Entzündung, die eine vermehrte Gastrin-Produktion zur Folge hat, die wiederum die Magensäureproduktion anhebt -> **Gastritis**

HP-assozierte Erkrankungen

**Chronische
Gastritis**

**Ohne Symptome
ca. 80%**

Peptische Ulkuskrankheit
Ulcus duodeni
98% Infektionsrate

Magenneoplasien
Adenokarzinom
2-3fach höheres Risiko
MALT-Lymphom
92% Infektionsrate

**Kofaktor für
NSAR-
Induzierte
Läsionen**

W. Fischbach et al. S2k-Leitlinie Helicobacter pylori... Z Gastroenterol 2016; 54: 327-363

Malfertheiner, P. et al.: Helicobacter pylori: perspectives and time trends. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2014;

Weitere HP assoziierte Krankheiten

- ▶ ITP
- ▶ Eisenmangel
- ▶ Vit. B12 Mangel

Prävalenz HP-Infektionen

- ▶ Erwachsene Weltbevölkerung ca. 50%,
- ▶ mit altersabhängiger Zunahme (ca. 1 % pro Lebensjahr in den Industrienationen)

- ▶ Westeuropa
 - ▶ 32% (Niederlande) - 84% (Portugal) bei Erwachsenen
 - ▶ 11% (Belgien) - 66% (Portugal) bei Kindern
 - ▶ 48% (Deutschland) bei Erwachsenen, 3% bei Kindern

- ▶ Nordeuropa ca. 30%
- ▶ Nordamerika ca. 30%

- ▶ Die Übertragung von *H. pylori* erfolgt von Mensch zu Mensch. Der genaue Übertragungsmodus (oral-oral, gastral-oral, fäkaloral bzw. deren Kombination) ist unklar.
- ▶ Es existieren keine anerkannten Präventionsstrategien zur Verhinderung einer *H. pylori*-Infektion.
- ▶ Eine wirksame Impfung steht zurzeit nicht zur Verfügung.

Eusebi LH, Zagari RM, Bazzoli F. Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection. *Helicobacter*. 2014;19 Suppl 1:1-5.
W. Fischbach et al. S2k-Leitlinie *Helicobacter pylori*... *Z Gastroenterol* 2016; 54: 327-363

Diagnose einer HP-Infektion

		Sensitivität (%)	Spezifität (%)
Invasiv Biopsie bei Gastroskopie	Kultur	70-90	100
	Histologie	80 - 98	90 - 98
	Urease-Schnelltest	90 - 95	90 - 95
	PCR	90 - 95	90 - 95
Nicht invasiv	Harnstoff-Atemtest	85 - 95	85 - 95
	Stuhl-Antigentest	85 - 95	85 - 95
	IgG-Antikörper im Serum	70 - 90	70 - 90

Indikationen zur *HP*-Eradikation

- ▶ **Gesicherte Indikationen**
 - ▶ Peptisches Ulcus (ventriculi oder duodeni)
 - ▶ Anamnestisch gesichertes peptisches Ulcus (nicht zuvor behandelt)
 - ▶ MALT Lymphom des Magens
 - ▶ Resektion eines Magenkarzinoms mit Restmagen
 - ▶ Dyspepsie in Populationen mit hoher *H. pylori* Inzidenz
 - ▶ Atrophe Gastritis
 - ▶ Erstgradig Verwandte von Patienten mit Magenkarzinom

- ▶ **Optionale Indikationen**
 - ▶ Dyspepsie ohne peptischem Ulcus
 - ▶ Therapie mit NSAR oder ASS
 - ▶ PPI-Langzeittherapie
 - ▶ Idiopathische thrombozytopenische Purpura
 - ▶ Eisenmangelanämie unklarer Genese
 - ▶ Populationen mit hohem Risiko für Magenkarzinom

HP-Eradikation

HP-Eradikation

Therapieschema	Dauer (Tage)	Kommentar
Sequenzielle Therapie		
PPI 2x1 + Amoxicillin 2x1g; danach: PPI + Clarithromycin 2x500mg + Metronidazol 2x500mg	5 5	Bei Clarithromycin-Resistenz bessere Eradikationsraten
PPI 2x1 + Amoxicillin 2x1g; danach: PPI + Levofloxacin 2x500mg + Metronidazol 2x500mg	5 5	Sequenzielle Therapie mit Levofloxacin
Quadrupeltherapie (Vierfachtherapie)		
PPI 2x1, Clarithromycin 2x500mg, Amoxicillin 2x1g, Metronidazol 2x500mg (Concomitant Therapy)	5–7 (bis zu 14)	Bei Clarithromycin-Resistenz bessere Eradikationsraten
PPI 2x1, Levofloxacin 2x500mg, Amoxicillin 2x1g, Metronidazol 2x500mg	5–7	Concomitant Therapy mit Levofloxacin
PPI, Doxycyclin [§] 2x100mg, Bismutsalz [§] , Metronidazol 3x500mg (Bismut-Quadrupeltherapie)	7	Kostengünstig, viele Tabletten, häufig milde Nebenwirkungen, Bismutsalze in Österreich nur über internationale Apotheke verfügbar
Tripeltherapie		
PPI 2x1, Clarithromycin 2x500mg, Amoxicillin 2x1g (French Triple)	7–14	Patienten, die zuvor kein Makrolid erhielten*
PPI 2x1, Clarithromycin 2x500mg, Metronidazol 2x500mg (Italian Triple)	7–14	Patienten mit Penicillinallergie ohne vorherige Makrolid-Exposition*
PPI 2x1, Amoxicillin 2x1g, Levofloxacin 2x500mg	7–14	Erfolg abhängig von der Rate an Chinolonresistenzen

C. Högenauer: Eradikation von Helicobacter pylori: österreichische Empfehlungen; Jatro Infektiologie & Gastro. 3 2013

HP-Resistenzen in Ö

- ▶ Daten von europäischer Multicenterstudie:
 - ▶ Clarithromycinresistenz: 37%
 - ▶ Levofloxacinresistent: 23%
 - ▶ Megraud F et al. Gut 2013;62:34-42
- ▶ Daten bei pädiatrischen Patienten (Wien und Graz):
 - ▶ Clarithromycinresistenz: 25-34%
 - ▶ Metronidazolresistenz: 23-31%
 - ▶ Vecsei A et al. Helicobacter 2010; 15:214-20
 - ▶ Prectl J. et al. Pediatric Infectious Disease Journal 2012; 31:312-4

HP-Eradikationsraten 2002 - 2015

Nyssen OP et al.: Sequential versus standard triple first-line therapy for *Helicobacter pylori* eradication - Review, 2016 The Cochrane Collaboration.

Cochrane
Library

Cochrane Database of Systematic Reviews

HP-Eradikation 2017 - 20..

- ▶ **Kommentar aus der Praxis. Prof. Dr. J. Labenz**
 - ▶ Dtsch Med Wochenschr 2016; 141: 1518-1527.
 - ▶ Die moderne HP-Therapie erfolgt heute im Regelfall mit **einer Bismuth-Quatrupel-Therapie** (Omeprazol, Bismuth, Tetrazyclin, Metronidazol)
 - ▶ oder einer konkomittierenden Therapie (PPI, Amoxizillin, Claritromycin, Metronidazol)
 - ▶ oder bei günstiger Resistenzlage **14 Tage Tripel-Therapie**
- ▶ **Kommentar Prim. Doz. Dr. M. Gschwandner**
 - ▶ Clinicum 5/2017; 20-21
 - ▶ Die Tripeltherapie ist out!
 - ▶ Wenn eine Tripeltherapie durchgeführt wird...
... sollte sie auf 14 Tage ausgedehnt werden!

HP-Eradikation

S2k-Leitlinie HP

- ▶ Es sollten solche Therapieschemata angewendet werden, die ... eine **Eradikationsrate von mindestens 80 %** erreicht haben.
- ▶ Die **Rate schwerwiegender Nebenwirkungen** ... sollte **unter 5 %** liegen.
- ▶ Bei hoher Wahrscheinlichkeit für eine primäre Clarithromycin-Resistenz sollten in der Erstlinientherapie **eine Bismuthhaltige Quadrupeltherapie oder eine kombinierte („konkomittierende“) Vierfachtherapie** eingesetzt werden.
- ▶ Bei niedriger Wahrscheinlichkeit für eine primäre Clarithromycin-Resistenz können in der Erstlinientherapie eine Standard-Triple-Therapie oder eine Bismuth-basierte Quadrupeltherapie eingesetzt werden.
- ▶ Nach erfolgloser primärer Standard-Triple-Therapie sollte eine Bismuth-basierte Quadrupeltherapie erfolgen.

W. Fischbach¹, P. Malfertheine : **S2k-Leitlinie Helicobacter pylori** und gastroduodenale Ulkuserkrankheit. Z Gastroenterol 2016; 54: 327-363

S2K-Leitlinien 2016

- ▶ Eine **zusätzliche Probiotikagabe** zu einer wirksamen H. pylori Therapie kann erfolgen, um die **Verträglichkeit der Eradikationsbehandlung zu verbessern**.
- ▶ **Probiotika können** neben einer Verminderung der H. pylori-Kolonisation die Nebenwirkungsrate der Eradikationstherapie senken und dadurch **die Compliance verbessern**.
- ▶ Dies kann in einer **Steigerung der Eradikationsrate** resultieren. Insbesondere bei Patienten mit vorangegangenem Eradikationsversagen können Probiotika die Wirksamkeit einer erneuten Therapie verbessern.

W. Fischbach¹, P. Malfertheine : **S2k-Leitlinie Helicobacter pylori** und gastroduodenale Ulkuskrankheit. Z Gastroenterol 2016; 54: 327-363

Antibakterielle Wirkung von *Lactobacillus* ssp

- ▶ Untersuchungen mit cell-free spent culture supernatants (CFCs)

B

Scanning electron microscopy micrographs showing the transformation of the helical form of *H. pylori* to the U-shaped form after treatment with *L. acidophilus* strain LB.

V Liévin-LeMoal, AL Servina: Anti-Infective Activities of *Lactobacillus* Strains in the Human Intestinal Microbiota
Clinical Microbiology Reviews 2014: Vol 27/2

Antibakterielle Wirkung von LCR 35

Hemmung des Wachstums pathogener Keime

C. Forestier et al. "Probiotic activities of Lactobacillus casei rhamnosus: in vitro adherence to intestinal cells and antimicrobial properties" Res Microbiol 2001; 152

Wirkung von Probiotika bei HP-Eradikation

- ▶ Metaanalyse von 45 RCTs mit 6997 Patienten (PubMed, EMBASE, Ovid, The Cochrane Library & 3 Chinesische Datenbanken)
- ▶ Zeigt die Überlegenheit der HP-Eradiktion, ergänzt durch Probiotika:
- ▶ Overall-Eradikation: 83,3% Probiotika-Gruppe vs. 72,1% Kontrollgruppe
 $p < 0,001$ sowohl nach PP- als auch ITT-Analyse
- ▶ Inzidenz von Nebenwirkungen: 21,4% Probiotika-Gruppe vs. 36,3 %
Kontrollgruppe
 $p < 0,001$
- ▶ **CONCLUSION: The use of probiotics plus standard therapy was associated with an increase in the H. pylori eradication rate, and a reduction in adverse events resulting from treatment in the general population.**

Zhang M. et al.: Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: A systematic review and meta-analysis.
World J Gastroenterol 2015 : 4345-4357

Wirkung von Probiotika bei HP-Eradikation

Eradikationsraten	RTCs	Patienten n	Probiotika -Gruppe (%)	Kontroll- Gruppe (%)	P- Wert
Erwachsene	23	4116	81,8	73,2	<0,001
Kinder	7	498	76,9	64,8	0,002
Therapiedauer $\geq$ 15 Tage	17	3411	81,2	71,4	<0,001
Therapiedauer < 15 Tage	24	2585	82,3	71,3	<0,001
First-line Therapie	16	3474	81,0	71,0	<0,001
Second-line Therapie	3	435	88,6	81,1	0,058

Zhang M. et al.: Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: A systematic review and meta-analysis.

World J Gastroenterol 2015 : 4345-4357

Wirkung von Probiotika bei HP-Eradikation

Nebenwirkungen	RTCs	Patienten n	Probiotika- Gruppe (%)	Kontroll- Gruppe (%)	P- Wert
Diarrhoe	26	4935	5,7	13,7	<0,001
Übelkeit	23	4067	7,0	12,8	<0,001
Epigastrische Schmerzen	8	1806	6,1	14,1	<0,001
Abdominale Blähungen	13	1516	10,8	14,5	0,005
Abdominale Schmerzen	10	1373	8,4	13,1	0,005
Verstopfung	13	2021	4	6,7	0,002
Geschmacks-Störungen	19	3611	11,8	18,8	<0,001

Zhang M. et al.: Probiotics in Helicobacter pylori eradication therapy: A systematic review and meta-analysis.

World J Gastroenterol 2015 : 4345-4357

Wirkung von Lactobazillus ssp bei HP-Eradikation

Eradikationsraten	RTCs	Patienten	Therapie	Verbesserung
L. Rhamnosus GG	4	293	Tripel-T	keine
L. Johnsonii NCC 533	1	20	PPI	Atemtest besser
L. Johnsonii NCC 533	1	53	Clarithromycin	HP-Zahl geringer
L. Johnsonii NCC 533	4	298	Keine	Atemtest besser
L. Casei Shirota	1	14	Keine	Atemtest besser
L. Casei Shirota	1	64	Tripel-T	Eradikationszahl höher
L. Casei DN-114	1	84	Tripel-T	keine
L. Reuterii DSM 17938	1	40	Quadrupel-T	keine
Acidiphilus LB	1	120	Tripel-T	Eradikationszahl höher
Acidiphilus LB	1	84	PPI & Amoxicillin	keine
Acidiphilus LB	1	120	Keine	Keine

V Liévin-LeMoal, AL Servina: Anti-Infective Activities of Lactobacillus Strains in the Human Intestinal Microbiota
Clinical Microbiology Reviews 2014: Vol 27/2

Antibiophilus® Pulver zum Einnehmen (Beutel)

- ▶ Über 50 Jahre in Verwendung
- ▶ Arzneimittel seit 1999 (Z.Nr.: 1-23449)
- ▶ Wirkstoff: Lactobacillus casei rhamnosus (LCR35) 1.5×10^8 CFU
- ▶ Indikation: Behandlung von Durchfällen unterschiedlicher Genese, insbesondere auch von Antibiotika- oder Strahlentherapie- bedingten Durchfällen.
Bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern, Kleinkindern, Säuglingen, Neugeborenen und Frühgeborenen ab einem Geburtsgewicht von 1000 g.
- ▶ Keine Einschränkungen (Alter, Immunstatus, Komorbiditäten, Schwangerschaft ...)
- ▶ Keine bekannten Nebenwirkungen
- ▶ Preis: 10 Beutel € 4,80 (Kassenpreis) bzw. 6,90 (Privatverkaufspreis)

Austria Codex
Fachinformation

Antibiophilus® weitere Eigenschaften

▶ Gentisch Stabil seit 1966

- ▶ S. Coudeyras et al. "Taxonomic and Strain-Specific Identification of the Probiotic Strain *Lactobacillus rhamnosus* 35. within the *Lactobacillus casei* Group" *Appl. Environm. Microbiol* 2008; 74 (9): 2679 - 89

▶ Hemmt das Wachstum pathogener Keime (u.a. *E.Coli*, *Klebsiella*, *Clostridium*, *Pseudomonas*, *Salmonella* ..)

- ▶ C. Forestier et al.: Probiotic activities of *Lactobacillus casei rhamnosus*: in vitro adherence to intestinal cells and antimicrobial properties. *Res Microbiol* 2001; 152: 167 - 73

▶ Verbessert die Wirkung von Antibiotika um durchschnittlich 21%

- ▶ Probiotics, Antimicrob. Proteins 2016 Nov 10. Influence of Hydrogen Peroxide, Lactic Acid, and Surfactants from Vaginal *Lactobacilli* on the Antibiotic Sensitivity of Opportunistic Bacteria. Sgibnev A., Kremleva E.

▶ Stärkung der Epithel-Barriere gegen Pathogene

- ▶ Fang H-W. et al.: Inhibitory effects of *Lactobacillus casei* subsp. *Rhamnosus* on *Salmonella* lipopolysaccharide-induced inflammation and epithelial barrier dysfunction in a co-culture model using *Caco-2*/peripheral blood mononuclear cells *J Med. Microbiology* 59:573-579;2010

▶ Nachgewiesene Wirkung bei Diarrhoe und zur Prävention der NEC

- ▶ Urbancsek et al. : Results of a double-blind, randomized study to evaluate the efficacy and safety of antibiophilus in patients with radiation-induced diarrhoea. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2001; 13:391-396
- ▶ Schmolzer G et al. Multi-modal approach to prophylaxis of necrotizing enterocolitis: clinical report and review of literature. *Pediatr Surg Int.* 2006

▶ Überlebensfähig ab pH 3

- ▶ Data on file beim Hersteller

LCR 35 (Antibiophilus®) zur Prävention der AAD bei HP-Eradikation

- ▶ Geeigneter Kandidat aufgrund seiner Eigenschaften
- ▶ Gute Erfahrungen mit > 40 Patienten, die durch eine systematische Erfassung verifiziert werden sollten.
- ▶ Nicht-Interventionellen Studie (NIS) nach §2 AMG (AGES - NIS004525)
- ▶ Durchgeführt in drei niedergelassenen Praxen
 - ▶ Dr. E. Uitz, Mariazell
 - ▶ Dr. K. Tonninger-Bahadori, Wien
 - ▶ PD. Dr. B. Bahadori, Schladming
- ▶ Mit 112 Patienten, die lege artis diagnostiziert und therapiert wurden (Übliche Ein- und Ausschlußkriterien für eine HP-Eradikationstherapie)

LCR 35 zur Prävention der AAD bei HP-Eradikation

Methode

- ▶ 112 Patienten mit klinisch relevanter und histologisch gesicherter HP-Infektion
 - ▶ Magenbiosie mit anschließender Histologie durch ein externes Labor
- ▶ HP-Eradikationstherapie nach folgenden Schemata:
 - ▶ Sequential Standard Triple Therapie (SST):
 - ▶ 5 Tage PPI 2x1 & Amoxicillin 2x1 g, Antibiophilus 1-2 Beutel
 - ▶ 5 Tage PPI 2x1, Levofloxacin 2x500 mg, Metronidazole 2x500 mg, Antibiophilus 1-2 Beutel
 - ▶ Standard Triple Therapie (ST):
 - ▶ PPI 2x1, Clarithromycin 2x500 mg, Levofloxacin 2x500 mg, oder Amoxicillin 2x1 g, Antibiophilus 2 Beutel
 - ▶ Nach 7 - 14 Tagen Zwischenkontrolle
 - ▶ Compliance, Nebenwirkungen der Therapie
 - ▶ Nach ca. 28 Tagen Endkontrolle
 - ▶ Compliance, Nebenwirkungen der Therapie,
 - ▶ HP-Stuhl-Antigentest durch ein externes Labor

LCR 35 zur Prävention der AAD bei HP- Eradikation Ergebnisse

- ▶ Adherence:
 - ▶ Von 112 Patienten kamen 107 (95,5%) zur Endkontrolle,
- ▶ Nebenwirkungen der Therapie:
 - ▶ 3 Patienten berichteten über eine Diarrhoe (> 3 weicher bis wässriger Stuhl pro Tag)
(7,1% ITT-Analyse bzw. 2,8% PP-Analyse)
 - ▶ 7 Patienten hatten gastrointestinale Nebenwirkungen
 - ▶ keine schweren Nebenwirkungen gemäß AMG
- ▶ Wirkung:
 - ▶ 102 Patienten mit negativem HP-Stuhl-Antigentest (91,1% ITT-Analyse, 98,1% PP-Analyse)
 - ▶ 5 Patienten mit positivem HP-Stuhl-Antigentest

LCR 35 zur Prävention der AAD bei HP- Eradikation Ergebnisse

LCR 35 zur Prävention der AAD bei HP-Eradikation

Diskussion

- ▶ Eine NIS ist nur deskriptiv, es gibt keine Studienhypothese und keine Vergleichsgruppe
- ▶ Die Angaben zu Nebenwirkungen beruhen auf Patientenangaben („weiche Daten“)
- ▶ Die Einschussdiagnose und die Eradikationsraten beruhen auf den Ergebnissen externer Labors („harte Daten“)
- ▶ Forderung des Cochrane-Reviews und der S2k-Leitlinien nach Eradikationsraten >90% bzw. >80% konnte erfüllt werden.
- ▶ Nebenwirkungsrate von 20% des Cochrane-Reviews klar unterschritten
- ▶ Kein zusätzliches Risiko für den Patienten
- ▶ Zusätzliche Therapiekosten < 1€ pro Tag
- ▶ **Große Multicenter-Studie mit einem Kontrollarm ist unbedingt notwendig**

Kann man HP antibiotikafrei eradizieren?

- ▶ The Probiotic *Lactobacillus rhamnosus* for Alleviation of *Helicobacter pylori*-Associated Gastric Pathology in East Africa

Nieke Westerik, Gregor Reid, Wilbert Sybesma and Remco Kort

Die Zukunft von Laktobacillus als Therapeutikum

- ▶ Lactic Acid Bacteria for Delivery of Endogenous or Engineered Therapeutic Molecules

Peter A. Bron and Michiel Kleerebezem

Danke für Ihre Aufmerksamkeit