Der „unklare“ Hüft- und Leistenschmerz - wie (Gelenk-)Ursachen erkennen und rechtzeitig behandeln, um eine Arthrose zu vermeiden?

Dr. med. Wolfgang Zinser
Ordination: Hauptstraße 15
8753 Fohnsdorf/Steiermark Austria
www.orthoexpert.at

Leiter Gelenkerhaltende Chirurgie
LKH Tamsweg

em. Primar, Departmentleiter Hüftchirurgie
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
St. Vinzenz-Hospital Dinslaken Germany
www.st-vinzenz-hospital.de

Erklärung zu finanziellen Interessen

in den letzten 5 Jahren und kommenden 12 Monaten

- Ich habe keine persönliche Forschungsförderung unmittelbar finanziell oder in Form geldwerter Leistungen (Personal, Geräte usw.) erhalten (oder zu meiner persönlichen Verfügung)
- Ich habe in den letzten 5 Jahren als Referent ein Honorar oder als passiver Teilnehmer eine Kostenerstattung (Reise-/Übernachungskosten, bezahlte Teilnehmergebühren) erhalten von: Plasmaconcept, Bonesupport, DJO, Codon, Mathys.
- Ich bin bezahlter Berater Henworx, DJO, KarlStorz, Codon
- Ich bzw. mein Ehepartner/Partner/Kinder halte(n) kein Patent/Geschäftsanteile/Aktien o.ä. einer solchen Firma.

Aufbau des Vortrags

- Ursachen von Leistenschmerzen
- Anamnese und Klinische Untersuchung
- Bildgebende Diagnostik
- Coxometrie
- **Leitliniengerechte Therapie – Gelenkerhalt wo möglich!**
- Nachbehandlung nach OP
- Fallbeispiele

Hüftarthroskopie

Praxisbuch für die gelenkerhaltende Chirurgie

Herausgegeben von
Christian Sobau
Gregor Mückel
Hans Gollwitzer

Thieme

Diagnostik des Hüftgelenkes

AGA Hüft Komitee

www.aga-online.de

Facebook

Ursachen für Leistenbeschwerden

Abb. 4 ▲ Diagnostikpfad Grenzbereich „FAI und Sportlerleiste“. FAI Femoroacetabuläres Impingement, OS Oberschenkel, IRO Innenrotation, BÜ Beckenübersicht, HKN Hüftkopfnekrose, OP Operation, i. a. intraartikulär, Rö Röntgen. (Mit freundl. Genehmigung, © Jörg Schröder, alle Rechte vorbehalten)

Standard Hüftuntersuchung

Anamnese: Schmerz nach Belastung, tiefes Sitzen, Gehen, Alltag, Sport, Ruhe, Einklemmung, Knacken....

Standarduntersuchung:

- Gangbild, Beckenstand, Trendelenburg-Zeichen Rotationszeichen
- Bewegungsausmaße Ex/Flex, Aro/Iro, Abd/Add
- Impingement-Test
- Apprehension-Test
- Straight-Leg-Raise-Test
- FBBRE-Test
- Abduktoren/Adduktoren-Test
- Druckschmerz Leiste, Trochanter, Spina
- Lasegue und FBA (wenn pos., dann weitere WS-Tests)
- Rotationsmessung in Bauchlage (Fehlrotationen des Schenkelhalses)

Wenn unklar oder klinisches Mischbild → **Probeinfiltration**

Sekundärarthrose und präarthrotische Deformität

Präarthrotische Deformität wie FAI und Dysplasie:

Ausgehend von der klinischen Erfahrung, dass mechanische Fehlbaugelenke frühzeitig verschleifen, wurde der Begriff der „**Präarthrose**“ oder „**präarthrotischen Deformität**“ (Hackenbroch 1937) geprägt. Man sollte sich aber vor Augen halten, dass der „biomechanische Fehlbau“ zwar den entscheidenden Hauptfaktor für die frühzeitige Abnutzung darstellt, aber, wie früh dieser biomechanische „**Fehlbau**“ klinisch zum Tragen kommt, wird im Einzelfall unter anderem auch von der ererbten „**Materialqualität**“ (Gelenkkörper, periartikuläres Gewebe) und vom „**Lebensstil**“ (Beruf, Hobbies, Sport, Übergewicht etc.) als „modulierende“ Begleitfaktoren beeinflusst. Ein rein mechanistisches oder „röntgenkosmetisches“ Denken sollte deshalb bei der verantwortungsvollen Beratung des/der einzelnen Patienten/-in bezüglich oft aufwendiger und nicht ganz risikoloser Rekonstruktionseingriffe vermieden werden.

Sekundärarthrose:

Unter dem Begriff „**Sekundärarthrose**“ versteht man eine (meist vorzeitig eintretende) **Gelenkabnutzung aufgrund bekannter (primärer) Ursachen**. Bezüglich des mechanischen Fehlbaues (Tschauner u. Mitarb. 2002) als Ursache für eine sekundäre Koxarthrose kann man 2 Hauptgruppen unterscheiden:

1. die **Restdysplasie** (Tschauner u. Reichel 2003) als „Minusvariante“, Der Begriff der „**Restdysplasie**“ **bedeutet in diesem Zusammenhang keineswegs, dass die Vorbehandlung nicht lege artis durchgeführt worden wäre** (Matthiessen 1996, 1997a), sondern ist in der Regel Ausdruck eines schweren pathoanatomischen Ausgangsbefundes oder von im Laufe der Behandlung aufgetretenen Wachstumsstörungen.
2. das **femoroazetabuläre Impingement** (Ganz 2000) als „Plusvariante“ von Überdachung und Gelenkkörperkontakt.

Die Behandlung sekundärer Arthrosen richtet sich zunächst auf die zugrundeliegenden pathogenetischen („primären“) Ursachen; erst in zweiter Linie, wenn eine Behandlung der Ursache nicht möglich ist oder erfolglos bleibt, kommt eine symptomatische Therapie in Betracht.

Pathogenese Koxarthrose

Diagnose	%
Primäre Koxarthrose	12,3
Hüftdysplasie	51,1
FAI	12,5
Davon CAM	8,8
Davon Pincer	3,7
Hüftkopfnekrose	8,3
Posttraumatische Koxarthrose	7,8
Entzündlich	3,4
Morbus Perthes	1,7
Epiphysäre Dysplasie	0,1
Coxa vara <0,1	
Unbekannt	2,6

63% haben als Ursache eine evtl. korrigierbare Deformität

Trauma im Gegensatz zum Knie eher seltene Ursache!

Torsionsfehlstellungen?....

Oner A, Koksal A, Sofu H The prevalence of femoroacetabular impingement as an aetiologic factor for end-stage degenerative osteoarthritis of the hip joint: analysis of 1,000 cases. *Hip Int* 2016; 26: 164–168 et al.

Die retrospektive Studie, 1004 Patienten (690 Frauen und 314 Männer), Hüft-TEP-Patienten in einem Krankenhaus der Maximalversorgung in Istanbul zwischen 2005 und 2010. 3 Autoren: Auswertung präoperative konventionellen Röntgenbilder (a. p. und seitlich) anhand der bekannten Kellgren und Lawrence-Klassifikation unabhängig voneinander aus und wiesen jedem Patienten anhand definierter radiologischer Kriterien einen prädisponierenden ätiologischen Faktor für die bestehende Koxarthrose zu. Nach 3 Wochen befundeten die Autoren die Röntgenbilder ein zweites Mal. Eine ungeeignete oder unvollständige präoperative Bildgebung führte zum Ausschluss aus der Studie. Insgesamt zeigte sich bei den gestellten Diagnosen eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen den 3 Autoren.

Patienten mit einem nachgewiesenen FAI waren zum Operationszeitpunkt 59,3 +/- 13,7, Patienten mit einer primären Koxarthrose 67,8 +/- 9,8 Jahre alt, also **ca. 8 Jahre jünger!**

Tab. 1 Prädisponierende Faktoren der Koxarthrose.
 Quelle: Gronewold J. [Koxarthrose und Hüftendoprothetik – Das femoroazetabuläre Impingement als Ursache der Koxarthrose](#). *Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie* 2016; 154(03): 230 - 230. doi:10.1055/s-0036-1584852

Häufige behandelbare präarthrotische Deformitäten

- FAI (Femuroazetabuläres Impingement)
- Femorale Maltorsion
- Dysplasie
-

Standard Hüftdiagnostik

Röntgen:

- zentrierte Beckenübersichtsaufnahme
Zur Darstellung acetabulärer Abnormitäten (Coxa profunda, Protrusio oder acetabuläre Retroversion, Crossing Sign, **Lateraler CE-Winkel, Tragflächenwinkel**)
- Rippstein-Aufnahme
Ausziehung am ventralen Kopf-Hals-Übergang
Fehlendes Offset Femurkopf zum Schenkelhals, **alpha-Winkel**
Indentation-Sign
- Faux-Profil-Aufnahme
Anteriorer CE-Winkel
Gelenkspaltweiten anterior und dorsal

Hüft-MRT mit radiären Sequenzen um die SH-Achse,
sagittal, axial (**KEIN** Becken-MRT!), ggf. AT-Winkel

- Ausschluss Hüftkopfnekrose, Knorpelschäden → Arthrose, Knöch. Zysten, Knochenmarködem, Weichteilläsionen

Probeinfiltration

Was ist zu beachten?

Standardisierte Beckenübersichtsaufnahme

- Liegender Patient
- Beine 10-15° innenrotiert
- Becken neutral rotiert
 - Spitze Os Coccygs und Symphyse liegen auf einer Senkrechten
 - Symmetrische Foramen obturatoria
- Zentralstrahl :
 - Mittelpunkt zwischen proximaler Begrenzung der Symphyse (S)
 - Mitte (M) der Verbindungslinie beider SIAS
- Horizontal-Linie
 - Linie angelegt an die caudale Begrenzung der Tränenfiguren.
 - Die Senkrechte wird entsprechend zu dieser Linie gezeichnet.

Merke

Eine veränderte Aufnahmetechnik (hüftzentrierter Aufnahme, tiefzentrierte Beckenübersicht, intraoperative BV) führt zu signifikant anderen Winkelberechnungen.

Inklination des Beckens

Neutral pelvic tilt:
male 3 cm, female 4.5 cm

Rotation des Beckens

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel
- Alpha-Winkel
- Azetabulärer Index
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex
- AT-Winkel

Arthrosegrade nach Tönnis

Grad 0	Grad 1	Grad 2	Grad 3
- Normales Röntgenbild	- Subchondrale Sklerose - Leichte Gelenkspaltverschmälerung - Kleine Osteophyten	- Kleine subchondrale Zysten - Deutliche Gelenkspaltverschmälerung - Leichte Entrundung des Femurkopfes - Ausgeprägte Osteophyten	- Grosse subchondrale Zysten - Aufgehobener Gelenkspalt - Ausgeprägte Osteophyten - Entrundung des Femurkopfes

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel**
- Alpha-Winkel
- Azetabulärer Index
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex
- AT-Winkel

- Dysplasie: <math><20^\circ</math>
- Borderline: $20^\circ-22^\circ$
- Normal: $23^\circ-33^\circ$
- Pincer: $34^\circ-39^\circ$
- Protrusion: $>40^\circ$

Beckenübersicht

Winkel zwischen:

- Verbindung zwischen dem Kopfkzentrum (Z) und der lateralen Begrenzung der Facies lunata (E)

zur Senkrechten

Beckenübersicht (anterior-posterior)

- Durch Einzeichnen des lateralen Zentrum-Erker-Winkels nach Wiberg (CE-Winkel) kann bei Über- oder Unterschreiten des Normbereiches ein Pincer-FAI mit beurteilt bzw. eine Pfannendysplasie gemessen werden.
- Durch Einzeichnen der Konturen des vorderen und hinteren Pfannenrandes ("Crossing-Sign" bei Überkreuzung) kann eine Retroversion oder relativer Überstand des Pfannenrandes festgestellt und dargestellt werden.

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel
- Alpha-Winkel**
- Azetabulärer Index
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex
- AT-Winkel

- Normal: $< 55^\circ$
- Cam: $> 55^\circ$

Radiäre Rekonstruktion

Rippstein II Aufnahme

MR/CT, Hüfte axial, 45° Dunn

Winkel zwischen:

- Verbindung zwischen dem Punkt an dem die Schenkelhalskontur einen dem Umfang des Femurkopfes angelegten Kreis verlässt (A) und dem Kopfzentrum (Z)
- zur Schenkelhalsachse

Axiale Aufnahme (z.B. Rippstein)

Zur Bewertung der Asphärizität des Hüftkopfes (Cam-FAI).

Hierbei werden Alpha-Winkel (nach Nötzli) und Kopf-Hals-Offset bestimmt.

R

B

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel
- Alpha-Winkel
- Azetabulärer Index**
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex
- AT-Winkel

= Pfannendachwinkel, Tönnis-Winkel

- Dysplasie: >14°
- Normal: 3° - 13°
- Pincer: -7° - 2°
- Protrusion: -8°

Beckenübersicht

Winkel zwischen:

- Verbindung zwischen medialer Begrenzung der Facies lunata (E') und der lateralen Begrenzung des Azetabulums (E)

zur Horizontalen

Welche Parameter muss ich wissen?

Tönnis
Arthrosegrade

LCE-Winkel

Alpha-Winkel

Azetabulärer Index

Retroversionsindex

Extrusionsindex

AT-Winkel

Normal:

- Retroversions-Index 0%
- Vollständig antevertiertes Azetabulum ohne Überkreuzung von Vorder- und Hinterwand.

Fokales Pincer-Impingement:

- Retroversions-Index <30%

Azetabuläre Retroversion:

- Retroversions-Index >30%
- Spina-Zeichen
- Hinterwand-Zeichen

Beckenübersicht

Verhältnis zwischen:

- Anteil der retrovertierten Vorderwand (a)
- zum Durchmesser des Azetabulums (b).

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel
- Alpha-Winkel
- Azetabulärer Index
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex**
- AT-Winkel

- Dysplasie: >27%
- Normal: 17% - 27%
- Pincer: 12% - 16%
- Protrusion: <11%

Beckenübersicht

Verhältnis zwischen:

- Anteil des Femurkopfes lateral des Pfannenrandes (a)
- zum horizontalen Durchmesser des Femurkopfes (b)

Faux - Profil - Aufnahme

- Zur Beurteilung der ventralen Überdachung, durch Ausmessen des anterioren CE-Winkels und Beurteilung der dorsalen Gelenkspaltweiten. AIIS!
- Wichtige Information zur Operationsplanung bei der Dysplasie und beim Pincer-Impingement (Pfannen-retroversion).

Welche Parameter muss ich wissen?

- Tönnis Arthrosegrade
- LCE-Winkel
- Alpha-Winkel
- Azetabulärer Index
- Retroversionsindex
- Extrusionsindex
- AT-Winkel**
= femorale Antetorsion

Die femorale Antetorsion ändert sich mit dem Lebensalter und weist eine große Schwankungsbreite auf.

- Coxa retrotorta: <math><10^\circ</math>
- Grenzwert: $11^\circ-9^\circ$
- Normwert: $10^\circ-25^\circ$
- Grenzwert: $26^\circ-34^\circ$
- Coxa antetorta: $>35^\circ$

MR/CT Gleichzeitige Aufnahme vom proximalen Femur und dem Knie. Die Messart ist zu definieren (hier beschrieben nach Murphy)

Winkel zwischen:

- Linie zwischen dem Kopffzentrum (M) und dem Zentrum des proximalen Femurs auf Höhe der Basis des Schenkelhalses (O).
- und der dorsale Kondylenachse des Knies

MRT

Dreidimensionale Bildgebungen aus MRT

Radiäre Rekonstruktion

Femur

Head diameter: 46 mm
Neck diameter: 32 mm Normal:
Neck inclination: **140.8°** (123.0°-135.4°)*

*(Toogood et al., 2009)

Alpha angles

Femoral version

Neck version: **26.9°** Normal: 0.4° - 19.0°

Figure 1: Clockwise alpha angles.

Acetabulum

Acetabular cup diameter: 50 mm

Center edge angle

Expected range for LCE between 22° and 33° (Tannast et al., 2011)

Acetabular coverage

Acetabulum orientation

Sourcil Angle: 10.0°

Version: 18.2°
Normal: 16° - 26°
(Köhlein et al., 2009)

Version of upper hemisphere*: 13.6°

*The version measurement in the right-most image is calculated halfway between the joint center and the top of the acetabulum.

Posterior coverage: 35.9% (Normal: 35%-43%)
Anterior coverage: **29.1%** (Normal: 30%-38%)
Total coverage: **65.0%** (Normal: 66%-81%)*

*(Dandachli et al., 2008)

Häufige behandelbare präarthrotische Deformitäten

- FAI (Femuroazetabuläres Impingement)
- Femorale Maltorsion
- Dysplasie
-

Femuroacetabuläres Impingement (FAI)

Definition:

pathologisch verfrühter knöcherner Kontakt zwischen Schenkelhals und Azetabulum mit Einschränkung des Bewegungsumfanges des Hüftgelenkes

FAI

Pincer

Mischformen
am häufigsten!

Cam

- Lokalisiert (12:00- 3:00 Uhr vorne oben) oder rundherum
- Frauen mittleren Alters
- Knorpelschaden nur feiner Streifen neben Labrum
- Dorsocaudale Knorpelläsion/
Verminderung dorsaler GS in Faux-Profil
- Meist Labrumschaden → Ossifikation

- Lokalisiert aber meist (vorne oben)
- Junge Männer ab 20 Jahren!
(Screening?)
- Knorpelschaden **größer mit Ablösung**

FAI Epidemiologie und Entstehung im Sport

Athletes

Gerhardt et al ⁶¹	Professional soccer players (US)	95 (75M, 20F)	AP pelvis, frog lateral x-ray	Cam deformity in 68% of male and 50% of female hips; pincer anatomy in 26.7% of male and 10% of female hips
Kapron et al ⁶²	Collegiate football players (US)	67 (134 hips) (all M)	Supine AP pelvis, frog lateral x-ray	95% with at least one finding of FAI: 72% with an abnormal alpha angle, 61% with crossover sign
Silvis et al ⁶³	Professional and collegiate hockey players (US)	39 (all M)	MRI	36% incidence of common adductor dysfunction, 56% with acetabular labral tears, 39% prevalence of cam deformity

- 7,3% m; 4,8% w; pos. Impingementtest bei gesunden 19jährigen (n=1170), Korrelation mit Cam-FAI (m) und sportlicher Belastung (Loborie et al. CORR 2012)
- Hohe Sportaktivität während der Heranwachsenden korreliert stark mit Auftreten eines CAM-Impingements (Siebenrock et al. CORR 2011)
- Leistungssportler nach FAI-Operation kehren schneller zum Sport zurück als Freizeitsportler, obwohl die Scores ähnlich sind. (Malviya, Villar et al. CORR August 2013)

Femuroacetabuläres Impingement

Häufigste Indikationen für die Hüftarthroskopie bei Leistenschmerzen

• **Femuroazetabuläres Impingement (FAI)**

- Labrumläsionen (auch Dysplasie? zur Festlegung des weiteren Procederes)
- Knorpelschäden und **Präarthrose**
- Freie Gelenkkörper
- Pathologien Lig. Capitis Femoris
- Schleimhautentzündung/-Veränderungen, Plicae, VNS
- Exploration bei liegender Tep (insb. V.a. Infekt!!)
- Psoastendinitis
- Unklare Hüftschmerzen (pos. Probeinfiltration!)
- Z. n. M. Perthes
- Restbeschwerden nach hüftnahen Frakturen

OP-Setup Hüftarthroskopie

Lagerung

Lagerung

Regionen schwieriger erreichbar

Lagerung

CAM-FAI → Camresektion

Pincer FAI + Labrumseparation → Pincer-Resektion und Labrumnaht

Labrumläsionen – meist sekundär!

- Resektion oder Rekonstruktion ? Innervation v. a. anterolat. → Schmerzen!
- Druckverteilung v.a. bei Dysplasie:
 - Verlust/ Defekt des Labrums führt zu Druckerhöhung des lateralen acetabularen Knorpels und Dezentrierung des Kopfes (Ferguson et. al. 2000)
- Sealing-Effekt (Ferguson et. al. 2003)

Klinische Relevanz von Labrumläsionen im MRT

The prevalence of acetabular labral tears and associated pathology in a young asymptomatic population

1. [A. J. J. Lee](#), MBChB, PgradDipSurgAnat (Dist), Orthopaedic Trainee¹;

2. [P. Armour](#), MSc, FRACS, Orthopaedic Surgeon¹;

3. [D. Thind](#), MBBS, MSc, Anaesthetic Trainee²;

4. [M. H. Coates](#), FRANZCR, Radiologist³; and

5. [A. C. L. Kang](#), FRANZCR, Radiologist³

± Author Affiliations

1. ¹Christchurch Hospital, Private Bag 4710, Christchurch 8140, New Zealand.

2. ²Dunedin Hospital, Private Bag 1921, Dunedin 9054, New Zealand.

3. ³Christchurch Radiology Group, PO Box 130-000, Christchurch 8141, New Zealand.

1. Correspondence should be sent to Dr A. J. J. Lee; e-mail: jabel@hotmail.com

Abstract

Acetabular labral tears and associated intra-articular pathology of the hip have been recognised as a source of symptoms. However, it is now appreciated that there is a relatively high prevalence of asymptomatic labral tears. In this study, 70 young asymptomatic adult volunteers with a mean age of 26 years (19 to 41) were recruited and underwent three tesla non-arthrographic MR scans. There were 47 women (67.1%) and 23 men (32.9%).

Labral tears were found in 27 volunteers (38.6%); these were an isolated finding in 16 (22.9%) and were associated with other intra-articular pathology in the remaining 11 (15.7%) volunteers. Furthermore, five (7.1%) had intra-articular pathology without an associated labral tear.

Given the high prevalence of labral pathology in the asymptomatic population, it is important to confirm that a patient's symptoms are due to the demonstrated abnormalities when considering surgery.

Cite this article: *Bone Joint J* 2015;97-B:623–7.

Labrumresektion oder Labrumerhalt?

Arthroscopic Debridement Versus Refixation of the Acetabular Labrum Associated With Femoroacetabular Impingement: Mean 3.5-Year Follow-up

Christopher M. Larson, M. Russell Giveans and Rebecca M. Stone
Am J Sports Med 2012 40: 1015 originally published online February 3, 2012
DOI: 10.1177/0363546511434578

The online version of this article can be found at:
<http://ajs.sagepub.com/content/40/5/1015>

Figure 1. Anteroposterior (AP) pelvis of the left hip in a 21-year-old collegiate hockey player with mixed pincer- and cam-type morphological characteristics. (A) Preoperative AP radiograph reveals acetabular retroversion (dashed curved line) and cam-type femoroacetabular impingement (FAI) (white arrow). (B) Postoperative AP radiograph reveals appropriate arthroscopic rim resection with an anteverted acetabulum (dashed curved line) and improved head-neck offset (white arrow). (C) Preoperative lateral radiograph reveals cam-type FAI (white arrow), and postoperative lateral radiograph (D) reveals improved head-neck offset after arthroscopic femoral resection osteoplasty.

Figure 2. (A) Intraoperative image of the right hip after focal labral excision and arthroscopic rim resection (arrows) for pincer-type femoroacetabular impingement (FAI) (group 1). (B) Intraoperative image of the right hip after labral takedown, rim resection, and labral refixation (arrows) for pincer-type FAI (group 2).

Conclusion: Although other factors may have influenced these results, labral refixation compared with an earlier cohort of focal labral excision/debridement resulted in better HHS, SF-12, and VAS pain outcomes and a greater percentage of good to excellent results at a mean 3.5-year follow-up.

Technik Pincerkorrektur mit Labrumrefixation

Knorpelbehandlung lokalisierter Defekte an der Hüfte

- Wenig und kurzfristige Daten über Effektivität von Knorpelbehandlungen am Hüftgelenk.
- Im Vgl. z. Knie:
 - Kugelgelenk weniger komplex
 - Entlastung nicht möglich!
 - Knorpelflächen deutlich kleiner
 - Knorpelbeschaffenheit unterschiedlich→ Transfer Kenntnisse Knie zu Hüfte schwierig!
- Kontrollierte Anwendung empfohlen → Eingabe ins Knorpelregister DGOU

Knorpelläsionen beim FAI

Cam

mixed

Pincer

Debridement

Mikrofrakturierung

Abrasion

AMIC an der Hüfte

Courtesy: Dr. Wolfram Steens

[Bone Joint J.](#) 2015 May;97-B(5):628-35. doi: 10.1302/0301-620X.97B5.35076.

Sustained five-year benefit of autologous matrix-induced chondrogenesis for femoral acetabular impingement-induced chondral lesions compared with microfracture treatment.

Fontana A¹, de Girolamo L².

[Muscles Ligaments Tendons J.](#) 2016 Dec 21;6(3):367-371. doi: 10.11138/mltj/2016.6.3.367. eCollection 2016 Jul-Sep.

Autologous Membrane Induced Chondrogenesis (AMIC) for the treatment of acetabular chondral defect.

Fontana A¹.

Knochenmarkaspirat...) Marrow Cellution[®]

Stammzellrecruiting durch Bump-Trimming?

MACT

Hüft-ASK bei Coxarthrose ?

Borderline indications

Borderline indications

post

Hüft-ASK bei Coxarthrose

Fazit:

- Indikation bei GS > 2-3mm nach ausführlicher Aufklärung bei jungen Patienten **und** begleitender FAI-Deformität oft gegeben!
- Nachbehandlung/Physiotherapie wichtig.
- Indikationsstellung im vgl. zu anderen Verfahren (chir. Hüftluxation etc.) erleichtert
- Bei jungen Patienten meist keine Alternativen.
- **Aber: Keine echte Alternative zur H-Tep!**
- Patienten müssen gut aufgeklärt werden (Beschwerden werden nicht ganz verschwinden, „Versuch“, möglicherweise keine Darstellung des zentralen Kompartiments möglich...)
- **Aber!** → Studiendaten: Ausmaß der Arthrose bestimmt das Outcome, (schlechtere und nur kurzfristige Ergebnisse)

Freie Gelenkkörper

- Freie Gelenkkörper:
 - Evtl. nicht alle zugänglich
z.B. bei Präarthrose
 - Aufklärung! offene Resektion erwägen!

Lig cap. Femoris/Plicae, Foveales impingement

- Lig. Cap. Femoris:
 - Funktion unklar (Kreuzband der Hüfte?)
 - Impingement häufig bei Borderline Dysplasie
 - Synovialpathologien
 - Resektion

Synoviale Pathologien

- Chondromatose
- PVNS
- Synovialitis /Rheuma
- Plicae

Hüft-ASK bei einliegender TEP

- Psoasimpingement,
- Unklare Schmerzen
- V.a. Infekt → Probebiopsie

Femorale Maltorsion

- Intraartikuläres Impingement
Siebenrock 2013 CORR
- Retrotorsion erhöht Gelenkdruck und begünstigt FAI
ähnlich „pincer“-Typ
Satpathy 2015 J Hip Pres Surg
- Schlechtere Ergebnisse nach ASK bei FAI und Antetorsion $<5^\circ$
Fabricant 2016 J Bone Joint Surg Am
- Extraartikuläres Impingement und ischiofemorales Impingement
Siebenrock 2013 CORR, Gomez-Hoyos 2016 Arthroscopy, ...
- Vermehrte Antetorsion $\rightarrow$ anteromediale Labrumschäden
Ejnisman 2013 Orthopedics
- Instabilität
Tibor 2013 CORR, Clohisy 2009 CORR, Fabricant 2012 Arthroscopy
- 51% der „Hüftpatienten“ mit pathologischer Femurtorsion ($>25^\circ$, $<10^\circ$)
Tannast 2016 AGA

Maltorsion erkennen?

→ Rotation Hüfte

Femoral Torsion†

Dependent Variable	<10° (N = 170)	10°-20° (N = 120)	>20° (N = 152)	P Value
IR at 90° hip flexion (deg)	9.4 ± 8.8	15.7 ± 10.8	22.4 ± 12.9	<0.001†
IR at neutral hip position (deg)	24.8 ± 12.5	30.9 ± 11.8	40.7 ± 14.8	<0.001†
ER at 90° hip flexion (deg)	48.1 ± 9.1	47.8 ± 8.9	45.5 ± 8.2	0.022†
ER at neutral hip position (deg)	28.6 ± 11.7	26.4 ± 10.4	22.7 ± 11.8	<0.001†
Abduction (deg)	42.8 ± 7.3	43.3 ± 7.4	43.8 ± 6.6	0.485
Flexion (deg)	108.8 ± 11.5	110.3 ± 14.3	111.4 ± 15.5	0.240

Chadayammuri 2016 JBJS Am

Femurtorsionsmessung im MRT/CT

Je caudaler der Referenzpunkt für die Definition der Schenkelhalsachse gewählt wird, desto größer fällt die Messung der Torsion aus.
 Die Methoden von Tomczak, Murphy und Dorn (*) zeigen signifikant erhöhte Werte für die Torsion verglichen mit den Methoden nach Lee, Reikeras und Sutter. Die Torsion wird unterschiedlich auf rein axialen (heller „box-plot“) oder auf schrägen („axial oblique“; dunkler „box-plot“) Schnitten bestimmt.

Bildlegende

Bild im Kontext

Quelle: Steppacher S, Lerch T, Schmaranzer F et al. Femorale Rotationspathologien. In: Sobau C, Möckel G, Gollwitzer H, Hrsg. Hüftarthroskopie. 1. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2018. doi:10.1055/b-005-145259

Abb. 11.10 Eine exzessive femorale Antetorsion führt zu einer verminderten Außenrotation der Hüfte (Mitte links).

Insbesondere in Kombination mit einer exzessiven azetabulären Anteversion kann dies zu einem posterioren Impingement führen (oben links). Eine verminderte Version des Acetabulums kann einem Impingement posterior durch die exzessive femorale Antetorsion entgegenwirken (unten links). Eine femorale Retrotorsion kann die Innenrotation der Hüfte vermindern und zu einem anterioren Impingement führen (Mitte rechts).

Quelle: [Steppacher S](#), [Lerch T](#), [Schmaranzer F](#), et al. [Femorale Rotationspathologien](#). In: [Sobau C](#), [Möckel G](#), [Gollwitzer H](#), Hrsg. [Hüftarthroskopie](#).

Fallbeispiel Hauptpathologie verminderte SH-Antetorsion

Bildlegende

Bei verminderter Torsion hilft die dreidimensionale Simulation und die intraartikuläre Infiltration zur Unterscheidung von intra- und extraartikulärem Impingement. Auch können diese kombiniert auftreten. Ziel ist eine impingementfreie Innenrotation von mindestens 30°. Bei erhöhter Torsion muss für die chirurgische Korrektur zudem eine potenzielle Valgusdeformität berücksichtigt werden.

Bild im Kontext

Quelle: Steppacher S, Lerch T, Schmaranzer F et al. Operative Therapie. In: Sobau C, Möckel G, Gollwitzer H, Hrsg. Hüftarthroskopie. 1. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2018. doi:10.1055/b-005-145259

Hüftdysplasie

Erfolge von Hüftscreeningprogrammen

- Kinder mit idiopathischen Hüftdysplasien bzw. -luxationen, die einer operativen Maßnahme zugeführt werden müssen, sind in Ländern, in denen ein Hüftscreeningprogramm besteht, zu einer Rarität geworden: Deutschland, Österreich, Tschechische Republik, Slowakei
- Die Rate an operativen Interventionen konnte auf mindestens $\frac{1}{5}$ im Vergleich vor der Zeit des Screenings in Deutschland gesenkt werden ([Günther et al. 1998]; [von Kries et al. 2003]; [Wirth et al. 2004]; [Ihme et al. 2008]).
- Die Inzidenz von Erstoperationen in Deutschland aufgrund einer kongenitalen Hüftdysplasie oder -luxation beträgt nach Einführung des Screenings 0,26 pro 1000 Lebendgeborene und ist im weltweiten Vergleich als sehr niedrig einzustufen ([Ihme et al. 2008]).

Biomechanik bei Hüftdysplasie

Vektorgraphische Schemazeichnung eines normal gebauten Hüftgelenks mit horizontaler Tragfläche: Die Gegenresultierende R' und ihre Komponenten (Querkomponente Q , Längskomponente P) sind eingezeichnet (nach Tschauer).

Quelle: [Tschauer C, Hofmann S. Residuelle Hüftdysplasie](#). In: [Tschauer C](#), Hrsg. [Orthopädie und Orthopädische Chirurgie - Becken, Hüfte](#). 1. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2004. doi:10.1055/b-002-6231

Vektorgraphische Schemazeichnung eines dysplastischen Hüftgelenks mit 35° kranio-lateral geneigter Tragfläche ($TF = 35^\circ$) und zusätzlicher Coxa valga. Ergänzend zur Gegenresultierenden R' und ihren Komponenten (Querkomponente Q , Längskomponente P) ist noch die vektorgraphische Zerlegung der vertikal gerichteten Längskomponente P in Bezug auf die (in diesem Beispiel) 35° geneigte Tragfläche eingezeichnet. Die Normalkomponente N ist senkrecht, die Tangentialkomponente S parallel zur Tragfläche ausgerichtet (nach Tschauer).

Biomechanik bei Hüftdysplasie

Schematischer zentraler Frontalschnitt durch ein gesundes Hüftgelenk: Die Facies lunata ist horizontal getroffen; medial (rechts) davon befindet sich die Fossa acetabuli, lateral (links) wird die Facies lunata vom Labrum acetabulare begrenzt.

Quelle: [Tschauner C, Hofmann S. Residuelle Hüftdysplasie](#). In: [Tschauner C](#), Hrsg. [Orthopädie und Orthopädische Chirurgie - Becken, Hüfte](#). 1. Auflage. Stuttgart: Thieme; 2004. doi:10.1055/b-002-6231

Schematischer zentraler Frontalschnitt durch ein dysplastisches Hüftgelenk. Im Schnittbild ist im Vgl. zu **links** die extreme Zug- und Scherbelastung des Labrum acetabulare gut erkennbar.

Prognose

Murphy et al. JBJS 1995

„The prognosis of untreated acetabular dysplasia ...“

LCE < 16° → alle Hüften endgradige Arthrose

Radiologie- standardisierte Beckenübersicht

Welche Messgrößen weisen auf eine azetabuläre Dysplasie?

- > Lateral Center-Edge Winkel (Wiberg)
- > Acetabulärer Index
- > Crossover sign/Retroversionsindex
- > Femurextrusionsindex
- > Abduktions-Bilder
- > Shenton Linie

Überdachung / Kongruenz / Femur

LCE 23°

LCE 8°

LCE -4°

Häufigkeit der Arten der Dysplasie

anterior

lateral

antero-lateral

posterior

8%

3%

72%

17%

— Vorderwand
..... Hinterwand

Therapie der präarthrotischen Deformität Dysplasie: knöcherner Korrektur des Azetabulums

A New Periacetabular Osteotomy for the
Treatment of Hip Dysplasias

Technique and Preliminary Results

REINHOLD GANZ, M.D.,* KAJ KLAUE, M.D.,** THO SON VINH, M.D., PH.D.,†
AND JEFFREY W. MAST, M.D.‡

Triple Pelvic Osteotomy

Dietrich Tönnis, M.D., Andreas Arning, M.D., Michael Bloch, M.D.,
*Achim Heinecke, Ph.D., and Klaus Kalchschmidt, M.D.

Orthopädische Klinik, Städtische Kliniken, Dortmund; and *Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik
der Universität Münster, Münster, Germany

Vergleich des Osteotomieverlaufs PAO (links) – 3FBO (rechts).

PAO vs Triple

Vorteile

- Nur eine Inzision notwendig.
- Lig. sacrospinale nicht am acetabulären Fragment (freie Reorientierungsmöglichkeit).
- Bessere direkte, postoperative Stabilität (Beckenring erhalten).
- Weniger Fixierung nötig, geringere Pseudarthroserate.
- Geringere Gefahr einer Nervenläsion (N. ischiadicus).
- Viel schnellere Rehabilitation!
Beugung erlaubt, Vollbelastung meist nach 10Wo (Triple 12 Wo Entlastung!)

Nachteile:

- Schwierigere Operation wegen schlechterer Sichtverhältnisse.
- Höheres Risiko der Hüftgelenksverletzung.
- Erhöhtes Risiko einer avaskulären Nekrose.
- Schnitt durchkreuzt die Y-Fuge, daher nicht vor Abschluss des Wachstumsalters.

Eigene Technik PAO

A New Minimally Invasive Transartortorial Approach for Periacetabular Osteotomy

By A. Troelsen, MD, B. Elmengaard, MD, PhD, and K. Soballe, MD, DMSc

Investigation performed at the Orthopaedic Research Unit, University Hospital of Aarhus, Aarhus, Denmark

Beispiel 1: PAO

Langzeitergebnisse

Study	Study design; level of evidence ⁴⁸	Follow up (years)	Percent follow up	Hips/patients	Age at surgery	Previous surgery	Survival rate
Siebenrock et al. ⁵⁰ (1999)	Retrospective case series; IV	11.3 (10-13.8)	100%	75/63	29 (13-56)	23 (31%)	82% at 10 years
Kralj et al. ⁶⁶ (2005)	Retrospective case series; IV	12 (7-15)	100%	26/26	34 (18-50)	NA	85%
Steppacher et al. ²⁶ (2008)	Prognostic; III	20.4 (19-23)	91%	75/63	29.3 (13-56)	23 (31%)	61% at 20 years
Troelsen et al. ⁶⁷ (2009)	Prognostic II	6.8 (5.2-9.2)	81%	116/96	29.9 (14.1-57.0)	14 (12%)	82% at 9 years
Matheney et al. ⁶⁵ (2009)	Prognostic; II	9 ±2.2	85%	135/109	26.7 ±9	27(20%)	84% at 10 years
Ito et al. ⁶⁸ (2011)	Therapeutic; IV	11 (5-20)	95%	166/146	32(12-56)	NA	96%
Albers et al. ⁵² (2013)	Therapeutic; III	11 (10-14)	97.5%	165/147	Group I:29 (12-55) Group II:28 (13-44)	36 (22%)	Group I: 90% at 10 years Group II: 78% at 10 years

Arthroskopie bei Hüftdysplasie

- Ergebnisse bei ACE $<17^\circ$, Tönnis $>15^\circ$ und Alter $>42 \rightarrow$ schlecht (Akihisa Hatakeyama et al AJSM 2018)
- Schmerzreduktion durch Labrumresektion signifikant aber kurzfristig LCE $> 22^\circ$ (Costa und Villar 2006)
- Keine Unterschiede der Resultate nach Arthroskopien bei grenzwertigen und echten Dysplasien nach 2 Jahren (Byrd & Jones 2003)

Arthroscopic Management of Dysplastic Hip Deformities

Predictors of Success and Failures With Comparison to an Arthroscopic FAI Cohort

Christopher M. Larson,¹ MD, James R. Ross,¹ MD, Rebecca M. Stone,¹ MS, ATC,
Kathryn M. Samuelson,¹ BS, Emma F. Schelling,¹ BS, M. Russell Giveans,¹ PhD,
and Asheesh Bedi,² MD

AJSM PreView, published on November 30, 2015

Conclusion: Arthroscopic management of mild to moderate acetabular dysplasia had inferior good/excellent results and higher failure rates when compared with an FAI cohort; therefore, isolated arthroscopic procedures in this population should be cautiously considered. These results were independent of patient sex. Labral repair and capsular plication resulted in better clinical outcomes in this mildly dysplastic cohort.

Dysplasie & Impingement

Clohisy et. al.
CORR
2009

Inzidenz:

72%
55% superior
35% anterior

alpha- Winkel > 55°
im Kreissegment

Günther et. al.
Orthopäde
2010

18%

alpha- Winkel > 50°

Impingement Adversely Affects 10-year Survivorship After Periacetabular Osteotomy for DDH

Clin Orthop Relat Res (2013) 471:1602–1614

Christoph E. Albers MD, Simon D. Steppacher MD,
Reinhold Ganz MD, Moritz Tannast MD,
Klaus A. Siebenrock MD

Nachbehandlung

- **FAI**: abhängig von Ausmaß der Resektion, Knochenstatus, Knorpeltherapie, Labrumtherapie,.... (Teilbelastung 2-6 Wo, CPM 4-6 Wo, Hyaluronsäure, VitD,)
- **Derotationsosteotomie**: 6 Wo TB, Rö-Kontrolle
- **PAO**: 6Wo TB, Rö-Kontrolle, Sitzen und Beugung bis 90° erlaubt

Gelenkerhaltende Chirurgie wirkt:

- 84,6%-88% Return to play/Sport durch HASK nach 7,4M av., obwohl Nachbehandlung sehr unterschiedlich und keine Assessments...
(Review: O'Connor et al, AJSM 2018, Minkara et al, 2019, AJSM)
- Vorangehende HASK hat **keinen** negativen Einfluss auf das Outcome einer späteren Hüft-Tep! (Lindmann et al, 2021, Acta Orthopaedica; Rosinsky et al 2019, Arthroscopy)
- Knorpelregister/DART DGOU Hüfte: n=2269, kontinuierliche Verbesserung IHot innerhalb 60M von 45 auf 70, 80% Zufriedenheit!
- PAO 93% >10 J ohne Tep (Shon et al, 2021, Arch Orthop Truma Surg)
- HASK hilft sogar bei Arthrose! (Review 22 Studien: Kemp et al, 2015, Clin. Orth & Rel. Research)
- Langzeiterfolg nach HASK 5-20J, in besten Studien nur 3% Tep nach 10 J (Review: Kyin et al, 2021, Arthroscopy)

ACTA ORTHOPAEDICA
2021, VOL. 92, NO. 4, 408-412

Prior hip arthroscopy does not affect 1-year patient-reported outcomes following total hip arthroplasty: a register-based matched case-control study of 675 patients

Ida LINDMAN¹, Jonatan NÄTMAN², Axel ÖHLIN^{1,3}, Karin SVENSSON MÄLCHAU^{1,3}, Louise KARLSSON MAZAR MOHADDES^{1,3}, Ola ROLFSON^{1,3}, and Mikael SANSSON^{1,3}

Gelenkerhalt wirkt!

Stand • 8. Dezember 2020

Knorpelregister DGOU → DART
Aktueller Registerstand: 9134

Knie

n = 5961

Neu in 2020
n = 459

OSG

n = 904

Neu in 2020
n = 61

Hüfte

n = 2269

Neu in 2020
n = 226

Seit Einführung des KnorpelRegister DGOU im Oktober 2013 wurden bis zum 8. Dezember 2020 9615 Patienten aus mehr als 122 teilnehmenden Kliniken in das KnorpelRegister DGOU eingetragen. Das größte Modul stellt weiterhin das Modul "Kniegelenk", gefolgt vom Modul "Hüftgelenk" und dem "Sprunggelenk" dar.

OSG 9,53%
 Hüfte 24,13%
 Knie 66,34%

Beispiel

Vorstellung 25.6.2018:

- 17 J weiblich,
- seit 2 Jahren Schmerzen im Bereich beider Hüften, derzeit linksseitig führend. Schmerzen bei Belastung. Schulsport wird seit längerer Zeit nicht mehr ausgeübt, ab und an aber auch Ruheschmerzen. Eine Hüftgelenks-Dysplasie ist väterlicherseits bekannt.
- Gangbild: Nahezu unauffällig. Beckengeradstand. Trendelenburg-Zeichen negativ. Finger-Boden-Abstand 0 cm. Beweglichkeit beider Hüftgelenke Extension/Flexion 10-0-120 Grad. ARO/IRO 60-0-40 Grad, Abduktion/Adduktion 60-0-20 Grad. Endgradige Innenrotation bds. schmerzhaft. Impingement-Zeichen positiv,. Beidseits Leistenschmerzen. Kein Trochanterdruckschmerz. Straight-Leg-Raise-Test bds li > re positiv. Apprehension-Zeichen bds. dezent positiv. PDMS intakt. Lasegue negativ.

Abb. 1 ▲ C-Sign
 A Namengebende Form der Hand bei Anzeige des hüftumgreifenden Schmerzes. B Anzeige des hüftumgreifenden Schmerzes mit C-Sign Haltung der Hand. © 2017 AGA-Hüft-Komitee

Abb. 9 ▲ Vorderer Impingement Test
 Beim klassischen Impingement Test wird das Hüftgelenk bei 90° Hüftbeugung (A) in Adduktion und Innenrotation (B) gebracht. © 2017 AGA-Hüft-Komitee

Diagnostik des Hüftgelenkes

AGA-Hüft-Komitee

Bildgebung

Bildgebung MRT

AT-Winkel

sagittal

frontal

Coxometrie

- Deformitäten:**
- Alhawinkel MRT 51°
 - LCE 17,7
 - Azetabulärer Index 14,1°
 - Femurextrusionsindex > 25
 - Crossing Sign?
 - VCA-Winkel
- Pathologien:**
- Impingement
 - Belastungsschmerz
 - Leistendruckschmerz
 - Psoassymptomatik
 - Labrumsymptomatik

Was würden Sie tun?

1. Eher muskulär bedingte Beschwerden: Konservative Therapie und Abwarten
2. Impingement im Vordergrund: Hüft-Arthroskopie mit Cam-Korrektur und Labrumsanierung
3. Dysplasie im Vordergrund: PAO
4. Kombination aus Dysplasie und FAI/Labrumpathologie:
 - a. PAO und FAI/Labrum gleichzeitig
 - b. PAO und FAI/Labrum zweizeitig

OP-Schritte 13.8.2018

1239	1239	123930	1239301	1239301	1239301	1239301
1993	1993	1993-0	1993-04	1993-04	1993-04	1993-04
R 180°						
NR 12						
RTE 1						
LIH 1						
W100						
L 50						
14:00:00	14:01:00	14:33:00	14:33:50	14:44:30	14:45:40	14:45:40
2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2

is 39°)

Verlauf

Vorstellung 21.3.2019:

- 18 J weiblich,
- Sie berichtet insgesamt über ein zufriedenstellendes Ergebnis nach stattgehabter Operation, wobei sie noch Schmerzen bei bestimmten Bewegungen sowie bei Rotationsbewegungen, beim längeren Sitzen sowie bei längeren Spaziergängen der linken Hüfte hat (mehr als 1 Std.).
- Die Patientin betritt das Untersuchungszimmer mit einem unauffälligen Gangbild. Hüfte links: Unauffällige Narben nach o. g. Operation. Bewegungsausmaß der linken Hüfte Extension/Flexion 0-10-135°. ARO/IRO 45-0-45°, Abduktion/Adduktion 45-0-40°. Keine Schmerzen bei passiver Innenrotation. Positive anteriolaterale Impingementzeichen. Apprehension-Zeichen positiv. Psoas-Test negativ. Negative Zeichen bzgl. eines posterolateralen Impingements. Vierer-Test negativ. DMS intakt.
- → ME und Hüft-ASK

14.10.19 ME und HASK Labrumnaht

Wiss. Hintergrund zum Vorgehen:

Figure 5. Incision of the new minimally invasive transarticular approach (red line). The anterior superior iliac spine is marked ASIS.

Table 1. Summary of studies reporting duration of surgery, blood loss, transfusion requirements, or length of hospital stay

Author (year)	No. hips	Age mean (range) year	Simultaneous femoral osteotomy no. hips	Surgical approach ^a	Duration of surgery mean (range) h	Blood loss mean (range) mL	Transfusion % of procedures No. port (range)	Length of hospital stay mean (range) day
Siebenrock (1999) (65)	75	29.3 (13–56)	16	MSP	3.5 (2–5)	2000 (750–4500)	100% 4 (1–11)	–
Trumble (1999) (20)	123	32.9 (14–54)	33	56 MSP 67 II	4.5 (–) 6.5 (–)	800 (–) 1400 (–)	–	–
Matta (1999) (18)	66	33.6 (19–51)	–	MSP	no fem. osteo. 3.1 (2–5) fem. osteo. 4.1 (3.2–6)	939 (400–2000) 980 (500–1800)	–	7.9 (4–29)
Davey (1999) (70)	70	36.5 (16–53)	–	MSP	3.4 (–)	–	–	–
Pogliacomì (2005) (63)	36	35 ^b (15–55)	0	4 MSP 32 II	3.3 (1.8–7)	2300 (800–6900)	–	– (7–10)
Kralj (2005) (62)	26	34 (18–50)	–	–	–	1400 (–)	–	–
Peters (2006) (26)	83	28 (25–47)	14	MSP	–	715 (–)	–	–
Atwal (2008) (80)	122	23.6 (18–28)	–	–	–	2191 (1200–4021)	–	5.3 (4–8)
Troelsen (2008) (I)	94	37 (14–58)	0	MIS	1.2 (0.8–2.0)	250 ^b (150–350) ^c	3% 2 (2–3)	8 ^b (7–9) ^c
Troelsen (2008) (II)	263	31 ^b (22–40) ^c 35 ^b (26–44) ^c	0 0	98 II 165 MIS	1.7 ^b (1.3–2.0) ^c 1.2 ^b (1.0–1.3) ^c	500 ^b (350–700) ^c 250 ^b (200–350) ^c	18% 2 (1–7) 4% 2 (1–3)	9 ^b (7–12) ^c 7 ^b (6–8) ^c

– Parameter not reported.

^a Approach: II – ilioinguinal, MIS – minimally invasive, MSP – modified Smith–Petersen

^b Median.

^c Interquartile range.

Orthopäde 2008
DOI 10.1007/s00132-008-1241-5
© Springer Medizin Verlag 2008

K.-P. Günther · F. Thielemann · A. Hartmann · P. Bernstein
Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus an der Technischen Universität, Anstalt des
öffentlichen Rechts des Freistaates Sachsen, Dresden

Koinzidenz von Hüftdysplasie und femuroazetabulärem Impingement

Klinisches Bild und simultane operative Korrektur

Clin Orthop Relat Res (2017) 475:1154–1168
DOI 10.1007/s11999-016-5169-5

Clinical Orthopaedics
and Related Research®
A Publication of The Association of Bone and Joint Surgeons®

SYMPOSIUM: 2016 BERNESE HIP SYMPOSIUM

One-third of Hips After Periacetabular Osteotomy Survive 30 Years With Good Clinical Results, No Progression of Arthritis, or Conversion to THA

Till Dominic Lerch MD, Simon Damian Steppacher MD, Emanuel Francis Liechti MD,
Moritz Tannast MD, Klaus Arno Siebenrock MD

Published online: 30 November 2016

© The Association of Bone and Joint Surgeons® 2016

Verlauf

Vorstellung 12.4.2021:

- 19 J weiblich,
- Linke Seite beschwerdefrei, leichte muskuläre Probleme Oberschenkelinnenseite. Zunehmende Probleme rechte Seite.
- → PAO re geplant

Entscheidungshilfe konservativ/operativ Hüfte

Konservativ

- Arthrose mit flächigen, eher generalisierten Knorpeldefekten KL $\geq$ 2 und höheres Alter
- Höheres Lebensalter > 55J
- Osteonekrose ARCO 1-2
- Dysplasie und > Tönnis 1

Operativ Gelenk erhaltend

- Hüfdysplasie ohne Arthrosezeichen → PAO
- Symptomat. Femuroazetabuläres Impingement mit Formstörungen (Gefahr Arthrose) → causale Knorpeltherapie (Hüft-ASK)
- Rotationsfehlstellungen (Derotationsosteotomie)
- Labrumläsion(Hüft-ASK)
- Nicht „rumprobieren“ sondern direkt die RICHTIGE Therapie

Zusammenfassung und Statement!

- Gelenkerhalt an der Hüfte funktioniert sehr gut, lindert Beschwerden, verschafft Mobilität, verzögert (vermeidet?) Gelenkersatz bei geringeren Risiken mit nachhaltigen Ergebnissen.
- Gelenkerhalt ist zwar anspruchsvoll (Zentren), wirkt aber in der flächendeckenden Realversorgung → Knorpelregister DGOU
- Gelenkerhalt bricht keine Brücken ab. Gelenkersatz geht gut nach Gelenkerhalt, umgekehrt geht das nicht!!!
- Gelenkersatz wird in den AGA-Ländern (DACH) vermutlich zu früh und zu häufig angewendet, Gelenkerhalt leider zu selten!

Forderungen

1

„Gelenkerhalt sollte dem Gelenkersatz mindestens gleichwertig vergütet und gefördert und als Standardverfahren ausgebildet werden, um Fehlversorgungen zu vermeiden.“
Derotationsosteotomie muss im LKF-...
...rektur mit Labrum etc. , PAO, ...ebildet werden wie eine Hüft-TEP

2

„Voraussetzung für den Gelenkerhalt ist die Ausbildung von Orthopäden und Chirurgen in der Gelenkerhaltung.“

3

„Wo Gelenkersatz als Standardverfahren gemacht wird, muss auch der Gelenkerhalt beherrscht werden!“

F.A.M.E.® HANDS-ON

KnorpelAkademie | Medizinische Universität Graz | QKG Qualitätskreis Knorpel-Repair & Gelenkerhalt e.V.

**1. GRAZER HÜFTKONGRESS
UND OP-WORKSHOP**
Hüftarthroskopie und Gelenkerhalt operativ

6. und 7. Mai 2022
Anatomisches Institut der Medizinischen Universität Graz

Zertifizierter Spezialkurs Hüfte der Deutschen Knorpelakademie zum Zertifikat: „Knorpelspezialist QKG“

F.A.M.E. meets QKG
Knorpeltherapie und Gelenkerhalt
am Knie
OP-Kurs an Humanpräparaten
GRAZ, 29. SEPTEMBER BIS 01. OKTOBER 2022

Förderung von Nachwuchsmedizinern
F.A.M.E.® NEXGEN

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

QKG | Qualitätskreis
Knorpel-Repair
& Gelenkerhalt e.V.